

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 23-6-66 5208-8

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

ABONNEMENT ANNUEL

(Tél. 72-58-72)

(AUDE, AVEYRON, GARD, HÉRAULT, LOZÈRE, PYRENEES-ORIENTALES)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 16, rue de la République - MONTPELLIER.

C. C. P. : MONTPELLIER 5.238-57

15 francs

N° 69 - JUIN 1966/26

5° Supplément

SEISIE DU POMMIER

En fonction des captures dans les différents centres de piégeage le deuxième traitement contre la Sésie du pommier devra être exécuté dès réception du présent bulletin.

Se rapporter au bulletin n° 68 (5ème supplément) du mois de mai pour ce qui est de la technique du traitement.

CULTURES LEGUMIERES

AVERTISSEMENT

CHENILLE A FOURREAU DE L'ASPERGE

Compte tenu de la biologie de ce parasite et des résultats du piégeage, le premier traitement devra être exécuté les 27 ou 28 juin et renouvelé à 2 reprises à 8 jours d'intervalle.

Trois traitements sont donc nécessaires.

D'après les renseignements que nous a communiqués le Laboratoire de Zoologie de l'Institut National de la Recherche Agronomique à Montfavet et au stade où en sont actuellement les travaux de recherche, les insecticides suivants peuvent être utilisés cette année :

Diazinophos : 45 g de M.A. à l'hectolitre
Azinphos : 40 g de M.A. à l'hectolitre
Phosalone : 120 g de M.A. à l'hectolitre
Fenthion : 100 g de M.A. à l'hectolitre
Carbaryl : 150 g de M.A. à l'hectolitre
Lindane : 75 g de M.A. à l'hectolitre

A l'exception du Carbaryl, qui est une poudre mouillable, tous les autres insecticides devront être utilisés sous forme d'émulsion.

Les pontes et les pénétrations des jeunes larves ayant lieu à la base des turions, il faut donc traiter ces derniers au niveau du sol et obtenir la pénétration de la bouillie à 4 ou 5 cm de profondeur, de manière à mouiller la partie souterraine de la tige et la terre l'entourant.

Le traitement sera exécuté avec un pulvérisateur, sans rechercher une très forte pression, à raison de 2000 à 2500 litres de bouillie à l'hectare. Ces quantités ne constituent qu'un ordre de grandeur car l'importance du volume de bouillie peut varier selon la densité de la plantation, l'âge de l'aspergière et le nombre de turions par touffe.

Dans les plantations peu attaquées d'une superficie supérieure à 1 ou 2 ha, le traitement pourra être appliqué, par mesure d'économie, sur les 5 premières rangées de la parcelle. En effet l'infestation commence toujours par les bordures et se poursuit lentement vers l'intérieur.

P. CHRESTIAN - J. LAVY

Inspecteur de la Protection des Végétaux : P. BERVILLE

7220

Ministère de l'Agriculture
STATION REGIONALE D'AVERTISSEMENTS
VITICOLES

Ecole Nationale Supérieure Agronomique
de MONTPELLIER

Montpellier le 18 juin 1966

NOTE : 9

MILDIOU - La maladie existe à peu près partout sous forme de taches en Languedoc et même en certains points du Roussillon à proximité des Albères.

Du mildiou sur grappes a été découvert, notamment à Aspiran, Montblanc, Pézenas, Puissalicon, Vendémian (Hérault); Beaucaire, Fourques, Gajen, St-Siffret, Vauvert, Vénajean (Gard); Douzens (Aude) etc, etc...

L'irrégularité de sa répartition dépend de l'importance des mouillères qui ont donné naissance aux foyers primaires, et des traitements qui ont été faits.

Une invasion du feuillage apparaît maintenant dans l'Hérault et dans le Gard.

Le temps orageux actuel risque d'accélérer la dégradation de l'état sanitaire du vignoble et de préparer du rot-brun pour le mois prochain.

Il y a donc lieu de poursuivre l'application immédiate des traitements lorsque ceux-ci remontent à quelques jours.

EUDEMIS - Le deuxième vol d'eudémis se poursuit en Pyrénées-Orientales à St-Jean Lasseille, Maury, etc... le traitement préventif qui s'y rapporte est à effectuer dès le 22 juin.

Dans l'Hérault les premières captures ont été faites à Aspiran, Baillargues.

Dans tous les cas, les poudrages sont à renouveler une dizaine de jours après la première application.

Le Directeur de la Station Régionale
d'Avertissements Viticoles :

G. BERNON